

CINQ ANNEES DE DEPISTAGE VOLONTAIRE DU VIH/SIDA DANS LES SITES DE KABGAYI, GITARAMA ET GITWE

Auteurs :

Dr Paulin BASINGA, Dr Daniel NGAMIJE, *Commission Provinciale de Lutte contre le SIDA, Gitarama*

E-mail : pbasinga@tulane.edu

Introduction

Le VIH/SIDA constitue un problème majeur de santé publique. Le Rwanda est parmi les pays les plus touchés par la pandémie. Le conseil et le test volontaire (VCT) au VIH est une des stratégies actuellement utilisées et qui a déjà prouvé son efficacité dans la prévention et le contrôle de la pandémie du SIDA.

Le ministère de la santé a décidé d'intégrer progressivement les services de CDV dans les activités courantes du Paquet Minimum d'Activités des centres de santé du pays. Depuis 2000, les centres de dépistage volontaire ont été progressivement installés dans la province de Gitarama. Cinq ans après, il est opportun d'analyser les données collectées sur les caractéristiques socio-démographiques, comportementaux et sur la séroprévalence.

Méthodes

La présente analyse concerne les données collectées progressivement dans les sites de Gitarama, Gitwe et Kabgayi à partir de 2000 jusqu'à 2004. Les tests statistiques suivants : test de Student, le Khi carré de Pearson etc., les mesures d'associations épidémiologiques, une analyse univariée et multivariée à l'aide d'une régression logistique ont été effectués.

Le logiciel Epi-Info 6.04 a été utilisé pour la saisie des données et SPSS pour l'analyse des données.

Résultats

Les résultats issus de cette analyse font état des faits suivants:

- Le statut sérologique VIH est susceptible d'être influencé par les paramètres sociodémographiques et comportementaux dont les plus significativement associés sont l'âge du premier rapport sexuel, la récurrence du testing volontaire et certaines raisons de dépistage volontaire dont : les maladies opportunistes, la référence médicale et l'activité sexuelle à risque.

- Le mariage et la peur d'une contamination après une relation sexuelle à risque viennent en première position des motifs de fréquentation de CDV.
- Une faible utilisation des services de dépistage volontaire par les jeunes de moins de 18 ans.
- Une faible utilisation du service par les clients de sexe masculin.

Conclusions et recommandations

Sur base des objectifs spécifiques à cette analyse, des recommandations sont émises tant aux autorités sanitaires de la province de Gitarama qu'aux bailleurs de fonds intervenant dans le domaine de la santé dans la province et plus particulièrement dans la lutte contre le VIH/SIDA afin d'intégrer toutes les dimensions spécifiques au problème VIH/SIDA tel qu'il est vécu à GITARAMA.